

Deslodyna Fast Junior tabl.uleg.rozpad.2.5



nasza cena: 7,65 zł

Opis słownikowy

Dawka	2,5 mg
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.uleg.rozpad.w.j.ust.
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Desloratadinum

Opis produktu

Deslodyna fast junior, 2,5 mg,
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Desloratadinum

Wskazania:

Deslodyna fast junior jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę objawów alergii.

Kiedy stosować:

Deslodyna fast junior łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Do objawów należą: kichanie, wodnista wydzielina lub swędzenie nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

Zalecana dawka to 2 tabletki 1 na dobę, przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.

Dzieci w wieku od 6 - 11 lat

Zalecana dawka to 1 tabletki raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przyjmować leku dłużej niż 10 dni.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.